

# Tamizaje Prenatal



CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

## **CDC Principal San Pedro Sula**

6 Ave. 4 Calle N.O. Bo Guamilito  
Tel.(504)2552-8961, 2557-7503

## **CDC Los Chalets SPS**

Blvd. del Norte, Col. Tara, Edificio Los Chalets local #3  
Tel.(504)2527-8186

## **CDC Galenos SPS**

Bo. Los Andes, 10 Ave, 11 Calle N.O.  
Tel. (504)2550-2803, 2550-2798

## **CDC Las Palmas SPS**

Bo. Las Palmas, Blvd. Juan Pablo II entre 17 y 18 calle,  
9 avenida S.O. Local # 3  
Tel.(504)2504-5999 Cel: (504) 3315-6236

## **CDC Universidad**

Boulevard Roberto Micheletti, 9 Ave, 24 Calle  
Tel.(504)2504-4636 Cel. 3192-7228

## **CDC Mackay**

Plaza Portal en el corazón del Sector Mackay, contiguo  
al Honduras-Corea  
Tel.(504)2540-4087 Cel. 3292-4081

## **CDC Plaza UNO**

Bulevar del ESTE, Col. Tepeaca  
Tel.(504)2504-0015 Cel.3342-5388

## **CDC Plaza Las Mercedes**

Bulevar del Norte, en la entrada de la Res. Las Mercedes  
Tel.(504)2540-4619 Cel.3327-9649

## **CDC Santa Rosa De Copán**

Dos cuadras y media al Sur del Parque Central, Bo. Santa  
Teresa frente a Medicentro y a la par de Hotel Karolina.  
Cel. 3161-0600 Tel. 2662-1712

-  [www.laboratorioscdc.com](http://www.laboratorioscdc.com)
-  Laboratorio CDC
-  [atencionalcliente@laboratorioscdc.com](mailto:atencionalcliente@laboratorioscdc.com)
-  (504) 9475-6548

Laboratorios CDC 2021



## ¿Cuánto demora el resultado?

Demora de 10 a 15 días hábiles.

Recuerda:

- Las pruebas del 1er y 2do trimestre no detectan anomalías cromosómicas si no el riesgo de padecerlas.
- No son pruebas diagnósticas si no que dan una probabilidad de que pueda ocurrir una alteración.

“Una visión más temprana significa más oportunidad.”



## Tamizaje para Preeclampsia de inicio precoz

### ¿Qué es la Preeclampsia?

Es una complicación del embarazo que causa hipertensión arterial (presión alta).

### ¿Qué es el tamizaje para Preeclampsia?

La primera prueba de detección en suero que analiza tres marcadores bioquímicos en la sangre:

- AFP
- PAPP-A
- PIGF

Estos marcadores nos indican el riesgo de padecer preeclampsia



**Se debe realizar entre las 11.1-13.6 semanas de embarazo.**

## Anomalías Cromosómicas en el 1er trimestre

### ¿Para qué sirve esta prueba?

Evalúa de manera confiable el riesgo de una madre de tener un bebe con síndrome de Down, Edwards y Patau.

### ¿Cuál es la muestra necesaria?

En una muestra de sangre materna, se analizan tres marcadores bioquímicos.

- AFP
- Beta hCG libre
- PAPP-A

La medición de la Beta HCG libre  
Permite una mayor sensibilidad para síndrome de Down.

Taza de detección	Falsos Positivos
<b>93%</b>	<b>5%</b>

**Se debe realizar entre las 11.1-13.6 semanas de embarazo.**

## Anomalías Cromosómicas en el 2do trimestre

### ¿Para qué sirve esta prueba?

Permite evaluar de manera confiable el riesgo de tener un bebe con:

- Espina bífida
- Anencefalia
- Defectos de la pared abdominal.
- Síndrome de Down
- Edwards

### ¿Cuál es la muestra necesaria?

En una muestra de sangre materna, se analizan cuatro marcadores bioquímicos.

- AFP
- Beta hCG libre
- Estriol
- Inhibina-A

Taza de detección		
Down	Espina Bífida	Anencefalia
<b>75%</b>	<b>90%</b>	<b>98%</b>

**Se debe realizar entre las 15-21.6 semanas de embarazo.**